

**Inbrija** <sup>®</sup>  
(levodopa inhalation powder)  
42 mg capsules



Imagen actualada



Cuando la reaparición  
de sus síntomas del

**Parkinson**

interfiera con su día,  
¡retome su vida! con

**levodopa de  
inhalación oral**

---

**INBRIJA<sup>®</sup>** es un medicamento recetado que se usa cuando es necesario para el tratamiento de episodios OFF en adultos con Parkinson que reciben tratamiento habitual con medicamentos de carbidopa/levodopa.

**No use INBRIJA** si toma o ha tomado un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa, como phenelzine o tranylcypromine, durante las últimas 2 semanas.

**Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 10-11.**

# ¿Interrumpen su día los síntomas del Parkinson?

Los “periodos OFF” son los momentos en los que reaparecen los síntomas del Parkinson, entre las dosis habituales del medicamento para la enfermedad.

En una encuesta en línea entre más de 3000 personas con enfermedad de Parkinson, realizada por la **Fundación Michael J. Fox**,

el **~70%** de las personas encuestadas declaró tener por lo menos dos periodos OFF al día.

Los síntomas podrían reaparecer incluso cuando esté tomando su medicamento para el Parkinson de manera habitual.



Imagen actuada

## Reconocer cuando los síntomas del Parkinson empiezan a reaparecer

La reaparición de los síntomas puede variar de una persona a otra, dentro de un mismo día, y de un día al otro.

Lea la siguiente lista para saber si usted experimenta cualquiera de estos síntomas y hable con su médico si los síntomas reaparecieran entre las dosis de su medicamento habitual para el Parkinson.

### Síntomas motores

- Estremecimiento o temblor
- Lentitud de movimientos
- Problemas de equilibrio
- Problemas con el movimiento de las manos
- Dificultad para hablar
- Rigidez
- Dificultad para levantarse de su asiento

### Síntomas no motores\*

- Ansiedad/ataques de pánico
- Sudor abundante
- Dificultad para pensar
- Cansancio o somnolencia
- Agitación
- Irritabilidad
- Trastornos del sueño

\*Se desconoce el efecto de INBRIJA en síntomas no motores.

**Inbrija**<sup>®</sup>  
(levodopa inhalation powder)

# La única levodopa de inhalación oral

INBRIJA es una formulación inhalada de la levodopa de su medicamento habitual para el Parkinson. INBRIJA no reemplaza su medicamento habitual de carbidopa/levodopa.

Use INBRIJA en cuanto sienta que sus síntomas del Parkinson empiezan a reaparecer (1 dosis por periodo OFF, no más de 5 dosis por día).

**INBRIJA puede empezar a surtir efecto en tan solo 10 minutos**



## Información de seguridad importante selecta

Informe a su proveedor de atención médica si toma:

- inhibidores de la MAO-B
- antagonistas de la dopamina (D2) (incluso phenothiazines, butyrophenones, risperidone, metoclopramide)
- isoniazid
- sales de hierro o multivitaminas que contengan sales de hierro

**No** maneje, opere maquinaria o realice otras actividades hasta que conozca la manera en la que INBRIJA le afecta. Pudiera presentarse somnolencia y quedarse dormido(a) repentinamente hasta un año después de haber iniciado el tratamiento.

**Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 10-11.**

# Use INBRIJA conforme sea necesario cuando empiecen a reaparecer los síntomas

## ■ Cargue, inhale y repita

La dosis de INBRIJA es de 2 cápsulas. No inhale oralmente más de 1 dosis (2 cápsulas) para cualquier periodo OFF. No tome más de 5 dosis (10 cápsulas) en un día.

1. Inserte una cápsula en el inhalador; después de presionar y escuchar el clic, su inhalador estará listo para usarse.
2. Inhale INBRIJA, retenga la respiración durante 5 segundos.
3. Retire la primera cápsula y repita con una segunda cápsula.

Consulta las Instrucciones de uso en [www.InbrijaLabelEspanol.com](http://www.InbrijaLabelEspanol.com)

**99.8%** de 629 personas en 2 estudios clínicos pudieron usar INBRIJA durante un periodo OFF después de las instrucciones.



# INBRIJA ofrece una vía de administración inhalada única



## INBRIJA puede ayudar a mitigar la reaparición de los síntomas del Parkinson.

INBRIJA puede empezar a surtir efecto en tan solo 10 minutos. En un estudio amplio se observaron mejorías importantes en síntomas motores 30 minutos después de haber inhalado INBRIJA.



## INBRIJA se inhala oralmente.

INBRIJA permite a la levodopa entrar a los pulmones. De los pulmones, la levodopa pasa a la sangre y después al cerebro. INBRIJA no depende del tracto digestivo para su absorción.

- Antes de usar INBRIJA informe a su proveedor de atención médica si tuviera asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o cualquier otra enfermedad pulmonar crónica.
- Informe a su proveedor de atención médica si sufre de broncoespasmo. Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares podrían jadear o tener dificultades para respirar después de inhalar INBRIJA. Si esto llegara a ocurrir, suspenda la inhalación de INBRIJA y busque atención médica de inmediato.



## INBRIJA se usa conforme se necesita.

Tómelo como le fue recetado cuando sus síntomas del Parkinson empiecen a reaparecer (1 dosis por periodo OFF, no más de 5 dosis por día).

- No deje de tomar su medicamento diario para el Parkinson. INBRIJA no reemplaza su medicamento habitual de carbidopa/levodopa.



## INBRIJA es ligero y portátil.

Es fácil llevar INBRIJA con usted. Guarde su INBRIJA a temperatura ambiente, 68°F a 77°F (20°C a 25°C), en un lugar seco.

- Mantenga las cápsulas en sus empaques de aluminio (blíster) hasta justo antes de que esté listo(a) para usarlas.

## Información de seguridad importante selecta

Antes de usar INBRIJA, informe a su proveedor de atención médica sobre sus trastornos médicos, entre ellos:

- somnolencia durante el día, trastornos del sueño, somnolencia/aletargamiento repentinos, o uso de medicamentos que incrementan la somnolencia, incluso antidepresivos o antipsicóticos
- mareos, náuseas, sudoración o desmayos al ponerse de pie
- movimientos anormales (discinesia)
- problemas de salud mental, tales como alucinaciones o sicosis
- impulsos incontrolables, tales como participar en juegos de azar, deseos sexuales, o comer o comprar compulsivamente
- glaucoma
- embarazo o planes de embarazarse. Se desconoce si INBRIJA pudiera afectar al feto
- amamantar o planes de amamantar. La levodopa puede pasar a la leche materna y se desconoce si pudiera afectar al bebé

**Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 10-11.**

# Pregunte a su médico acerca de INBRIJA

Antes de empezar a usar INBRIJA debe estar tomando un medicamento de carbidopa/levodopa para la enfermedad de Parkinson. INBRIJA no reemplaza este medicamento.

Los síntomas pueden variar de una persona a otra y pueden presentarse de manera diferente cada vez que reaparezcan.

**Informe a su médico sobre la reaparición de sus síntomas (también conocidos como “periodos OFF”) y pregúntele si agregar INBRIJA pudiera ser adecuado para usted.**



Vea el video demostrativo en línea en **ComoUsarINBRIJA.Com**

## Información de seguridad importante selecta

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas, y cambio en el color de la saliva o esputo.

**Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 10-11.**

# ¿Tiene preguntas acerca de INBRIJA?

**Para obtener INBRIJA, los Servicios de Apoyo para Recetas Médicas pueden ayudarle.**

Si desea hablar con un(a) enfermero(a) educador(a) sobre cómo usar INBRIJA o necesitara ayuda para entender la cobertura de su seguro médico llame a los Servicios de Apoyo para Recetas Médicas.



Número gratuito:

**1-888-887-3447**

De lunes a viernes, de 8 AM a 8 PM  
Horario del Este

INBRIJA.com



**Inbrija**<sup>®</sup>  
(levodopa inhalation powder)

# Información de seguridad importante

No use INBRIJA si toma o ha tomado un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa, como phenelzine o tranylcypromine, durante las últimas 2 semanas.

Antes de usar INBRIJA, informe a su proveedor de atención médica sobre sus trastornos médicos, entre ellos:

- asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), o cualquier enfermedad pulmonar crónica
- somnolencia durante el día, trastornos del sueño, somnolencia/aleatargamiento repentinos, o uso de medicamentos que incrementan la somnolencia, incluso antidepresivos o antipsicóticos
- mareos, náuseas, sudoración o desmayos al ponerse de pie
- movimientos anormales (discinesia)
- problemas de salud mental, tales como alucinaciones o sicosis
- impulsos incontrolables, tales como participar en juegos de azar, deseos sexuales, o comer o comprar compulsivamente
- glaucoma
- embarazo o planes de embarazarse. Se desconoce si INBRIJA pudiera afectar al feto
- amamantar o planes de amamantar. La levodopa puede pasar a la leche materna y se desconoce si pudiera afectar al bebé

Informe a su proveedor de atención médica si toma:

- inhibidores de la MAO-B
- antagonistas de la dopamina (D2) (incluso phenothiazines, butyrophenones, risperidone, metoclopramide)
- isoniazid
- sales de hierro o multivitaminas que contengan sales de hierro

No maneje, opere maquinaria o realice otras actividades hasta que conozca la manera en la que INBRIJA le afecta. Pudiera presentarse somnolencia y quedarse dormido(a) repentinamente hasta un año después de haber iniciado el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica si tuviera los siguientes efectos secundarios:

- **quedarse dormido(a) durante actividades cotidianas normales** con o sin señales previas. Si llegara a sentir aleatargamiento, no maneje o realice actividades en las que necesite estar alerta. Las posibilidades de quedarse dormido(a) durante actividades normales aumentan si toma un medicamento que provoque somnolencia.
- **hiperpirexia y confusión por suspensión del medicamento** (fiebre, músculos rígidos o cambios en la respiración y el ritmo cardiaco), si repentinamente suspendiera el uso de INBRIJA o de la carbidopa/levodopa, o si redujera repentinamente su dosis de carbidopa/levodopa.
- **baja presión arterial** al estar de pie (que puede estar acompañada de mareos, desmayos, náuseas y sudoración). Levántese lentamente después de haber estado sentado(a)/acostado(a).
- **alucinaciones y otras sicosis** – INBRIJA puede causar o empeorar el ver/escuchar/crear cosas que no son reales; confusión, desorientación o pensamientos desordenados; problemas para dormir; tener muchos sueños; sospechas excesivas o sentimientos de que la gente quiere hacerle daño; comportamiento agresivo, y sentimientos de agitación/inquietud.
- **impulsos incontrolables inusuales**, tales como deseos de participar en juegos de azar, comer o comprar compulsivamente, y deseos sexuales se han presentado en algunas personas que utilizan medicamentos como INBRIJA.
- **movimientos corporales súbitos e incontrolados (discinesia)** – INBRIJA podría causar o empeorar estos movimientos. Podría ser necesario suspender INBRIJA o modificar el uso de otros medicamentos para el Parkinson.
- **broncoespasmo** – Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades pulmonares podrían jadear o tener dificultades para respirar después de inhalar INBRIJA. Si esto llegara a ocurrir, suspenda la inhalación de INBRIJA y busque atención médica de inmediato.
- **aumento de la presión intraocular** en pacientes con glaucoma. Su proveedor de atención médica debería monitorear esto.
- **cambios en algunos resultados de laboratorio**, entre ellos los de pruebas del hígado.

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas, y cambio en el color de la saliva o esputo.

No inhale oralmente más de 1 dosis (2 cápsulas) para cualquier periodo OFF. No tome más de 5 dosis (10 cápsulas) en un día.



Consulte las Instrucciones de uso y el Folleto de información para el paciente en [INBRIJAlabelEspanol.com](http://INBRIJAlabelEspanol.com)



Imagen actualada



# Retome su vida con INBRIJA

Informe a su médico si la reaparición de los síntomas del Parkinson interrumpe su día y pida INBRIJA.

---

**Más información en [INBRIJA.com](https://www.inbrija.com)**

---

## **Información de seguridad importante selecta**

Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección del tracto respiratorio superior, náuseas, y cambio en el color de la saliva o esputo.

**Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 10-11.**

**ACORDA**<sup>®</sup>  
THERAPEUTICS

ACORDA THERAPEUTICS, el logotipo estilizado de ACORDA THERAPEUTICS, INBRIJA, y el logotipo de INBRIJA son todos marcas comerciales de Acorda Therapeutics, Inc.

©2021 Acorda Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. 4/21 INB10378